

E-10：環境の整備方法

		床	ベッド柵	食器	リネン・タオル	衣類	トイレ・便器
スタンダード プリコーション		清掃のみ (消毒不要) 体液・血液など による汚染時 は、汚れを取り 除いて半径1m 以上をエタノ ール清拭又は 0.5%～1%次 亜塩素酸ナト リウム液清拭 (どちらも2 度拭き)	エタノール清 拭 体液・血液な どによる汚染 時は、汚れを 取り除いてか らエタノール 清拭	通常の下善	そのままランド リーボックスに 入れる 体液・血液・排 泄物などがつ いたリネンは 、そのままビ ニール袋に入 れて汚染物名 を明記し、ラ ンドリーボッ クスに入れる	洗濯は患者又 は家族が行 う 体液・血液・ 排泄物などが ついたリネン は、そのまま ビニール袋に 入れて保管	トイレは毎日 清掃する 尿器・便器は 汚れを取り除 いた後ベッド パンウォッシャ ーで処理するか 、0.01%次亜 塩素酸ナトリウ ム液で1時間消 毒後乾燥
接触感染 予防策①	MRSA 疥癬 MDRP VRE ノロウイルス HBV など	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	そのままビニ ール袋に入れて 感染症名と汚 染物名を明記 し、ランドリー ボックスに入れ る 院内で処理す る場合は、中 材の熱水洗濯 機で処理する	洗濯は患者又 は家族が行 う 体液・血液・ 排泄物などが ついた衣類は 、そのままビ ニール袋に入 れて保管 院内で処理す る場合は、中 材の熱水洗濯 機で処理する	個室のトイレ を使用 便座の汚染が ある場合は汚 れを取り除いた 後エタノール で清拭 尿器・便器は 汚れを取り除 いた後ベッド パンウォッシャ ーで処理するか 、0.01%次亜 塩素酸ナトリウ ム液で1時間消 毒後乾燥
接触感染 予防策②	ノロウイルス デブライズ 菌 など	清掃のみ 吐物などによ る汚染時は、 汚れを取り除 いて半径1m 以上を0.5% ～1%次亜塩 素酸ナトリウ ム液で清拭(2 度拭き)	0.05%次亜 塩素酸ナトリ ウム液又はル ビスタで清拭 吐物などの汚 染がある場合 は、汚れを落 としてから0. 5%次亜塩素 酸ナトリウム 液又はルビス タで清拭	食器類の下膳 に関する約束 事項参照	そのままビニ ール袋に入れて 感染症名と汚 染物名を明記 し、ランドリー ボックスに入れ る 院内で処理す る場合は、中 材の熱水洗濯 機で処理又は 0.5%次亜塩 素酸ナトリウ ム液に10分 間浸漬	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	個室のトイレ を使用 便座の汚染が ある場合は汚 れを取り除いた 後0.5%次亜 塩素酸ナトリ ウム液又はル ビスタで清拭 尿器・便器は 汚れを取り除 いた後ベッド パンウォッシャ ーで処理するか 、0.5%次亜 塩素酸ナトリウ ム液で1時間 以上消毒後乾 燥
飛沫感染 予防策	インフルエン ザ ムンプス など	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	そのままビニ ール袋に入れて 感染症名と汚 染物名を明記 し、ランドリー ボックスに入れ る 院内で処理す る場合は、中 材の熱水洗濯 機で処理する	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	個室のトイレ を使用 便座の汚染が ある場合は汚 れを取り除いた 後エタノール で清拭 尿器・便器は 汚れを取り除 いた後ベッド パンウォッシャ ーで処理するか 、0.01%次 亜塩素酸ナト リウム液で1 時間消毒後乾 燥
空気感染 予防策	結核 水痘 麻疹 など	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	そのままビニ ール袋に入れて 感染症名と汚 染物名を明記 し、ランドリー ボックスに入れ る 院内で処理す る場合は、中 材の熱水洗濯 機で処理する	スタンダード プリコーシ ョンに順ず る	個室のトイレ を使用 便座の汚染が ある場合は汚 れを取り除いた 後エタノール で清拭 尿器・便器は 汚れを取り除 いた後ベッド パンウォッシャ ーで処理するか 、0.01%次 亜塩素酸ナト リウム液で1 時間消毒後乾 燥