

社会福祉法人 <sup>財団</sup> 豊陽済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアルL-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	1 / 9

### 文書改訂履歴

版数	改訂頁	改訂内容	作成日 作成者	承認日 承認者
1	—	新規発行	2017. 9. 1	2017. 9. 1
			小美野 勝	長原 光

社会福祉法人 <sup>財団</sup> 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアルL-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	2 / 9


## L-1：手術部位感染（Surgical Site Infection：SSI）

### <定義>

手術部位感染とは、術後30日以内（術野にインプラントが残されている場合は術後1年以内）に感染が生じていることをいう。

※インプラント：

### <手術部位感染の分類>



### <感染経路>

SSIの成立

細菌汚染量

細菌毒性（ビルレンス）

宿主である患者の抵抗力

内因性あるいは外因性病原体により、手術部位へ微生物が進入汚染することを防止しなければならない。

### <リスク因子>

年齢

DM

肥満

免疫機能

喫煙歴

術前の入院期間

栄養状態

身体の他の部位に存在する感染

社会福祉法人 <sup>豊岡</sup> 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル L-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	3 / 9

## <手術部位感染対策>

### 1. 術前の患者管理

- ・待機手術で手術部位から離れた部位に感染症がある場合は、感染症の治療後に手術を行う
- ・血糖値を管理し、周術期の高血糖状態を避けるほうが良い
- ・待機手術では少なくとも 30 日前に禁煙を行わせるほうが良い
- ・術前の入院期間を短くするほうが良い
- ・手術前日の入浴を行う（切開部位の汚染を取り除く）

### 2. 術前処置

- ・剃毛は行わない
- ・除毛が必要な場合には医療用電気クリッパーを使用し、手術直前に行う

### 3. 術野の皮膚消毒

#### <皮膚>

- ・消毒を行う前に切開部位とその周囲を洗浄し、汚染を取り除く
- ・ポピドンヨードまたは 0.5%エタノール含有クロルヘキシジンを用いる  
※基本的にポピドンヨードを第 1 選択とする

#### <粘膜>

- ・消毒を行う前に切開部位とその周囲を洗浄し、汚染を取り除く
- ・ポピドンヨードまたは 0.01~0.025%塩化ベンザルコニウム液を用いる  
※基本的にポピドンヨードを第 1 選択とする

### 4. 周術期抗菌薬投与

- ・手術部位に応じた抗菌薬を選択し、執刀時に体内薬剤濃度が上昇するよう初回投与する
- ・手術が長時間におよぶ場合は、抗菌薬を 3 時間毎に追加投与する
- ・予防的抗菌薬は、術後長期投与しない（術後 72 時間以上の投与で耐性化リスクが高まる）

### 5. ドレーン

- ・ドレーンは手術創とは異なる切開部位から、個別に留置する
- ・ドレーンは早期に抜去する
- ・閉鎖式のドレーンを使用することが望ましい

社会福祉法人 <sup>有限</sup> 財団 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル L-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	4 / 9

## 6. 手術創傷管理

外科・泌尿器科の場合、一次閉鎖された手術創はガーゼで被覆せず、適切な保温、湿潤環境が維持できるフィルムドレッシング材を用いる

脳外科の場合毛髪がある為フィルムドレッシング材は使用できないので、ガーゼ・伸縮性テープを用いて閉鎖創とする

ドレーン挿入部は、手術当日のみガーゼで覆い、その後は被覆なしとする

### <創傷管理手順>

#### ○外科・泌尿器科

手術当日：閉創後消毒なしでテガダームを貼用する

浸出液がテガダームの外へ漏れる場合は新しいものと交換する

術後2病日：朝の回診時にテガダームを除去し、被覆なしとする

術後7病日：全抜鉤・全抜糸とする

#### ○脳外科

手術当日：閉創後消毒なしでガーゼ保護、伸縮性テープで貼用する

術後1病日：皮下ドレーン抜去の為被覆を除去。ドレーン抜去後再度ガーゼ、伸縮性テープで閉鎖創とする

術後7病日：全抜鉤・全抜糸とする

#### ・シャワー・入浴処置管理

術後3病日で、シャワー浴可能とし、術後8病日目（抜鉤後）入浴可能とする





文書名	院内感染防止対策マニュアル L-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	7 / 9

## —外科—

### 手術前 (病棟)

- ▶ シート2の発行は入院時の担当看護師が行う。
- ▶ 予定された手術でシート2が外来で発行されている場合は、入院まで外来カルテの裏表紙に挟んでおく。
- ▶ シート2に30穴をあけ、入院カルテの「看護記録」の所に保管する。

### 手術後 (病棟・外来)

- ▶ シート2の記載を行う。記載方法は別紙参照。
- ▶ 術後30日まで記載をする。30日観察を行ったらシート2をカルテから抜き取り、病棟の回収ボックスに入れる。
- ▶ 外出、外泊等で患者が不在のときは、シート2に明記する。
- ▶ 30日前の退院の場合は、退院時受け持った看護師がシート2をカルテから抜き取り、外来カルテ裏表紙のポケットにいれる。外来カルテ表紙には「SSI シートあり」のメモを貼付する。退院時も創部の観察し記入する。
- ▶ 外来ナースは、退院後最初の外来時に創部を観察し、該当する手術後日数のところに印を押す。シート2を外来<sup>の</sup>SSI シート回収ボックスに入れる。
- ▶ 各科の担当者は、シート2を院内感染担当へ提出する。

### SSI の発生時

- ① 可能な限り培養検体を採取し、シート3を発行する。検体と検査伝票とともに細菌検査室へ提出する。
- ② 検体の採取が難しい場合(例えば胸腔内腫瘍でドレナージを行わなかった場合など)は、シート3に必要事項を入力して発行し、細菌検査室へ提出する。
- ③ SSI発生後もシート2の記載は続ける。
- ④ 再手術の時は、改めてすべてのシートを発行する。新たな手術として扱う。
- ⑤ 24時間以内の(後出血などの)再手術は同じ手術とみなす。
- ⑥ 創部感染の時に、筋層の縫合糸が見えたら、「深部感染」に該当する。
- ⑦ SSI発生後のシート2の扱いは前項(手術後の項)と同様。

## —脳外科—

### 手術前 (病棟)

- ▶ シート2の発行は手術準備の一環として、手術前日までに看護師が行う。
- ▶ シート2に30穴をあけ、「ワークシート」に保管する。

### 手術後 (病棟・外来)

- ▶ シート2の記載を行う。記載方法は別紙参照。
- ▶ 術後30日まで記載をする。30日観察を行ったらシート2をカルテから抜き取り、SSI シート入れに入れる。
- ▶ 外泊、外出等で患者が不在のときはシート2に明記する。
- ▶ 30日前の退院の場合は、退院時受け持った看護師がシート2をカルテから抜き取り、外来カルテ裏表紙のポケットにいれる。外来カルテ表紙には「SSI シートあり」のメモを貼付する。退院時も創部の観察し記入する。
- ▶ 外来担当医師は、退院後最初の外来時に創部を観察し、該当する手術後日数のところに印を押す。回収方法は、外来看護師が3F病棟担当者宛に気送子で送る。
- ▶ 各科の担当者は、シート2を院内感染担当へ提出する。

### SSI の発生時

- ① 可能な限り培養検体を採取し、シート3を発行する。検体と検査伝票とともに細菌検査室へ提出する。
- ② 検体の採取が難しい場合(例えば胸腔内腫瘍でドレナージを行わなかった場合など)は、シート3に必要事項を入力して発行し、細菌検査室へ提出する。
- ③ SSI発生後もシート2の記載は続ける。

文書名	院内感染防止対策マニュアル L-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	8 / 9

- ④ 再手術の時は、改めてすべてのシートを発行する。新たな手術として扱う。
- ⑤ 24 時間以内の（後出血などの）再手術は同じ手術とみなす。
- ⑥ 創部感染の時に、筋層の縫合糸が見えたら、「深部感染」に該当する。
- ⑦ SSI 発生後のシート 2 の扱いは前項（手術後の項）と同様。



社会福祉法人 <sup>恩賜</sup> 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル L-1：手術部位感染		
文書番号	感対-共手-L 医療関連感染サーベイランス 1-001-170901	ページ	9 / 9

## —泌尿器科—

### 手術前（病棟）

- ▶ シート 2 の発行は入院時の担当看護師が行う。
- ▶ シート 2 に 30 穴をあけ、入院カルテの「看護記録」の所に保管する。

### 手術後（病棟・外来）

- ▶ シート 2 の記載を行う。記載方法は別紙参照。
- ▶ 術後 30 日まで記載をする。30 日観察を行ったらシート 2 をカルテから抜き取り、病棟の SSI 担当者へ渡す。
- ▶ 外泊、外出等で患者が不在のときはシート 2 に明記する。
- ▶ 30 日前の退院の場合は、退院時受け持った看護師がシート 2 をカルテから抜き取り、外来カルテ裏表紙のポケットに入れる。外来カルテ表紙には「SSI シートあり」のメモを貼付する。退院時も創部の観察し記入する。
- ▶ 外来担当医師は、退院後最初の外来時に創部を観察し、SSI の有無をシートに記入する。回収方法は、外来看護師が 6 F 病棟担当者宛に気送子で送る。
- ▶ 各科の担当者は、シート 2 を院内感染担当へ提出する。

### SSI の発生時

- ① 可能な限り培養検体を採取し、シート 3 を発行する。検体と検査伝票とともに細菌検査室へ提出する。
- ② 検体の採取が難しい場合（例えば腹腔内腫瘍でドレナージを行わなかった場合など）は、シート 3 に必要事項を入力して発行し、細菌検査室へ提出する。
- ③ SSI 発生後もシート 2 の記載は続ける。
- ④ 再手術の時は、改めてすべてのシートを発行する。新たな手術として扱う。
- ⑤ 24 時間以内の（後出血などの）再手術は同じ手術とみなす。
- ⑥ 創部感染の時に、筋層の縫合糸が見えたら、「深部感染」に該当する。
- ⑦ SSI 発生後のシート 2 の扱いは前項（手術後の項）と同様。