

社会福祉法人<sup>恩賜</sup><sub>財団</sub>済生会支部埼玉県済生会栗橋病院






文書名	院内感染防止対策マニュアル F-10：予防内服する抗 HIV 薬について		
文書番号	感対-共手-F 職業感染予防 10-001-170901	ページ	1 / 2

文書改訂履歴

版数	改訂頁	改訂内容	作成日 作成者	承認日 承認者
1	—	新規発行	2017. 9. 1 小美野 勝	2017. 9. 1 長原 光

文書名	院内感染防止対策マニュアル F-10：予防内服する抗 HIV 薬について		
文書番号	感対-共手-F 職業感染予防 10-001-170901	ページ	2 / 2

F-10：予防内服する抗 HIV 薬について

商品名	ツルバダ	アイセントレス
一般名	テノホビル/エムトリシタビン	ラルテグラビル
略称	TDF/FTC	RAL
外観		
飲み方	1日1回 1回1錠	1日2回 1回1錠
	①  ツルバダ 1錠	+  アイセントレス 1錠
	②	 アイセントレス 1錠
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1回目は①をできるだけ早く内服</li> <li>・以降②→①→②→…と12時間ごと(*)に交互に内服する (*生活スタイルに合わせて1日2回内服すればよい)</li> <li>・食事の影響はない</li> </ul>	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2つ薬剤の合剤である</li> <li>・最も推奨されている薬剤である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他の抗 HIV 薬と比較して副作用や薬物相互作用が少ない</li> </ul>
主な副作用	このような症状に気付いたら、担当の医師または薬剤師に相談して下さい。 悪心、下痢、鼓腸、疲労感など	発疹、吐気、眩暈、下痢、頭痛、不眠 疲労感など
重大な副作用	まれに下記のような症状が現れる場合があります。その場合、[ ]内に示した副作用の初期症状が考えられるので、すぐに医師の診療を受けて下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・むくみ、尿量減少、口渇 [腎機能障害]</li> <li>・吐気、激しい腹痛、背部痛 [膵炎]</li> <li>・意識障害、過呼吸、手足の震え [乳酸アシドーシス]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発熱、全身倦怠感、食欲不振、発疹 [皮膚粘膜眼症候群、薬剤性過敏症症候群]</li> <li>・発熱、寒気、ふらふら感 [過敏症]</li> <li>・手足の筋肉の痛み、こわばり [横紋筋融解症、ミオパチー]</li> <li>・むくみ、尿量減少、口渇 [腎機能障害]</li> <li>・食欲不振、全身倦怠感、吐気、黄疸 [肝機能障害、肝炎]</li> </ul>